

## **Ismertető és beleegyező nyilatkozat a méhnyakon végzett diagnosztikus műtétről** **(conisatio)**

név:

kórterem:

A beavatkozáshoz, melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon az alábbi ismertetéssel is szeretnénk segítségére lenni a betegségről, következményeiről és az előforduló szövődményekről.

### ***A betegség***

Az elvégzett vizsgálatok alapján Önnek olyan méhszajelváltozása van, amelynek pontos szövettani tisztázása feltétlenül szükséges a további kezelés megválasztása érdekében, illetve bizonyos esetben a betegség megoldását is jelenti. A műtét elvégzését indokolhatja:

1. cytologiai kenet eredménye,
2. nagyító eszközzel, illetve szabad szemmel is látható hámelváltozások a méhszájon.

### ***A betegség veszélyei***

Amennyiben a műtét nem történik meg, úgy az esetleges rákmegelőző állapotok, illetve a még korai szakban lévő, jól kezelhető daganatos elváltozások nem kerülnek időben felismerésre.

### ***A kezelés lehetőségei***

1. Kimetszés a méhszájból.
2. Konizáció.

### ***A műtéti eljárás***

A műtét osztályunkon általában altatásban történik. A beavatkozás első szakaszában általában abráziót (gyógykapatást) végzünk, mely során eltávolítjuk a méhnyálkahártyát, majd a második szakaszban a méhszájból kis szövetmintát veszünk, vagy a méhszájon körkörös metszéssel kúp alakú szövetet metszünk ki (konizáció). Ezt követően a méh nyakcsatornájába egy műanyag draint helyezve a sebszéleket öltésekkel egyesítjük, majd a hüvelyt gézcsíkkal tamponáljuk. Az eltávolított szövetrészeket szövettani feldolgozásra küldjük.

### ***Lehetséges szövődmények és következmények***

Valamely beavatkozás abszolút veszélymentességét egyetlen orvos sem garantálhatja. Ezen műtéti beavatkozásnál a súlyos komplikációk igen ritkák. A beavatkozás során elvégzett abráziónál a méh perforációja (műszerrel történő áthatolás a méh falán) lehetséges, kialakulhat bővebb vérzés a műtéti területről, a későbbiekben utóvérzés jelentkezhet és fertőződik a műtéti seb. A műtéti beavatkozás késői következménye lehet a méhszaj hegesezése, mely nagyon ritkán akadályozhatja a menstruációs vér kiürülését, csökkenhet a későbbiekben a teherbeesés esélye, illetve szüléskor a méhszaj tágulása lassabb, nehezebb.

### ***Beleegyező nyilatkozat:***

A fent leírtakat elolvastam, azt megértettem. Az időközben felmerült kérdéseimre kielégítő választ kaptam. Mindezek után kérem, hogy a tervezett műtétet rajtam elvégezzék.

Amennyiben a kórházat az ügyeletes orvosnak tett bejelentés nélkül elhagyja, az osztály a lakóhely szerint illetékes rendőrséget az Ön egészsége érdekében értesíti.

Szentes,

.....  
a felvilágosítást és/vagy műtétet  
végző orvos aláírása

.....  
a beteg vagy törvényes  
képviselőjének aláírása