

Ismertető és beleegyező nyilatkozat a tervezett hüvelyi méheltávolítás műtéti beavatkozásról

NÉV:

Kórteremszám:

A beavatkozáshoz, melyet Önön terveztünk, szükséges az Ön beleegyezése.
Ahhoz, hogy dönteni tudjon az alábbi ismertetéssel is szeretnénk segítségére lenni.

Javallatok:

A hüvelyi méheltávolítás leggyakoribb javallata a méh süllyedése, előesése. A betegség lényege, hogy a méh előesése a hüvelybemeneten át igen sok kellemetlenséggel jár. Zavarja a mindennapi munkában, sokszor a nemi életet lehetetlenné teszi, előbb-utóbb fájdalmakkal társul, melyeket befolyásolni alig lehet. Az állandósuló méhelőesés következménye, hogy a különben is sérüléken méhszájrészt kisebesedik és nehezen gyógyuló sebből kisebb-nagyobb fokú vérzést észlelhet.

Az anatómiai eltérés mindig társul a vizeletelvezető rendszer kényszerű zavarával. Úgy mint vizelési képtelenség fordulhat elő. Az ellenkező eset pedig az, hogy a vizeletét nem tudja tartani akaratlagosan. Az előzőhöz hasonlóan a székletürítés is zavart szenved (székrekedés és hasmenés is előfordulhat).

Az Ön ezen betegségét diétával, gyógyszerekkel vagy egyéb módon meggyógyítani nem lehetséges, ezért a méhet műtéti úton el kell távolítani, majd plasticai műtétet kell végezni. Megjegyezzük, hogy igen idős korban a hüvelybemenet zárásával ugyan a méh előesése korrigálható, de a nemi élet a továbbiakban nem lehetséges. A hüvelyi méheltávolítás második leggyakoribb oka gyógyszeresen nem befolyásolható vérzészavar, többnyire változó korban. Ezen vérzészavar hátterében igen sokszor a méhizom betegségei, a méh belhártya betegségei találhatók. A méhizomjóiindulatú daganata /myoma/ is képezheti az indikációt. Ezen megbetegedés is fájdalmakkal, vérzési rendellenességekkel, székelési és vizelési zavarokkal és egyéb panaszokkal járhat. Fontos tudni, hogy a kor függvényében az ép petefészkek, petevezetők nem kerülnek eltávolításra. A változó kort követő években viszont a petefészkek is eltávolításra kerülnek, hiszen azok rosszindulatú elváltozásaira sajnos még számolni lehet.

Lehetséges szövődmények:

Abszolút garanciát valamely műtét sikeréért egyetlen orvos sem vállalhat. Az orvosi beavatkozások általános veszélyei, mint a fertőzések, thrombosisok, emboliák, műtéti melléksérülések, utóvérzések az orvostudomány haladásával ma már ritkák, s ellenük a korábbiaknál sokkal többet tudunk tenni.

A kismencedében végzett műtétek során a környező szervek közelsége miatt előfordulhat a vizeletelvezető rendszer (úgy mint a vesevezeték, a hólyag és a hólyagvezeték) sérülése. Előfordulhat a vastagbél és végbél sérülése. A sérülés korrigálására a lehetőségek adottak. A helyesen mérlegelt feltételek és javallatok, a megfelelő technikával végzett műtét ellenére is szükség lehet a hüvelyi méheltávolítást hasi úton befejezni, hasmegnyitásra váltani. Fel nem ismert összenövések, a petefészkek vagy a kürt kisméretű, tehát korábban nem diagnosztizálható rosszindulatú daganata teheti szükségessé az átállást, vagy hüvelyi úton el nem látható vérzés.

Kérjük segítsen nekünk - vizsgálatainknál és a kezelés közben,

- az Önnek feltett kérdések gondos megválaszolásával,
- adatok szolgáltatásával,
- az orvosi utasítások pontos betartásával.

Kérjük beleegyezését, hogy a műtétet Önön elvégezhessük, továbbá, hogy amennyiben a műtét közben annak tervét, kiterjedését meg kell változtatnunk, azt megtehessek.

Amennyiben a kórházat az ügyeletes orvosnak tett bejelentés nélkül elhagyja, az osztály a lakóhely szerint illetékes rendőrséget az Ön egészsége érdekében értesíti.

Szentes, 20.....

.....
a felvilágosítást és/vagy

.....
a beteg vagy törvényes képviselőjének