

# Felvilágosítás műtéti érzéstelenítésről

*Kedves Asszonyom! Tisztelt Uram!*

## **Műtét előtti időszak**

Műtétje előtt szükség van aneszteziológiai (altatóorvosi) konzíliumra, annak érdekében, hogy az érzéstelenítés során fellépő kockázatot a minimálisra csökkentsük. Ezért önt az Aneszteziológiai Ambulanciára irányítják, vagy felkeresi egy altatóorvos a műtét előtti napokban. Nagyon fontos, hogy ekkor az egészségi állapotával kapcsolatos kérdésekre pontosan, mindenre kiterjedően válaszoljon. A rendelkezésére álló korábbi betegségeiről készült zárójelentéseket, laboratóriumi leleteket bocsássa az orvos rendelkezésére. Ezt követően az orvos megvizsgálja és elkészíti az érzéstelenítés tervét. Utasításokat ad a további gyógyszerek bevitelére, az étkezésre és az esetlegesen elvégzendő kiegészítő vizsgálatokra. Felvilágosítást nyújt az érzéstelenítéssel kapcsolatban, és az Ön kérdéseire válaszol. Amennyiben megnyugtatóan tájékozódott a tervezett érzéstelenítésről, olvassa el figyelmesen a beleegyező nyilatkozatot és a felmerülő kérdések tisztázása után kérjük írásos hozzájárulását, hogy az érzéstelenítést elvégezhessük.

## **Az érzéstelenítésről**

Végtagi, gáttáji, hasfali, kismedencei szervek műtéteihez ún. regionális vagy vezetéssel érzéstelenítést használunk. Ilyenkor a műtét helyétől távolabb, a végtag eredésénél vagy a gerinc közelébe adunk helyi érzéstelenítőt, amivel a fájdalmat vezető idegrostokat átmenetileg kikapcsoljuk. Ezzel a módszerrel 1,5-4 órás fájdalommentességet érhetünk el, de műtét közben nem fájdalmas nyomást, húzást érezhet. A műtét során ébren van. Szüksége lehet közben infúzióra, gyógyszerekre, nyugtatóra. A műtéti területet nem fogja látni. Ha a műtői zajok zavarják, kérjük jelezze. Ezen érzéstelenítési formák során nagyon ritkán, 20 000-50 000 érzéstelenítésre jut egy komolyabb, ám nem életveszélyes szövődmény. Nem kell félnie bénulástól! Amíg az érzéstelenítés hatása el nem múlik, a húgyhólyag kiürítését nem tudja szabályozni. Átmeneti fejfájás előfordulhat.

Az érzéstelenítés másik nagy csoportja az altatás vagy más néven narkózis. A műtétet megelőző fél-1 órával az elalvást segítő altató, nyugtató hatású injekciót kap, majd a műtőben maszkon keresztül „altatógázt” vagy vénájába altatószert adunk, amelytől elalszik. A fájdalommentességet a biztonságos altatás vezetés és az operáló orvos munkájának megkönnyítése érdekében izomellazítók adásával egészítjük ki. Ezek a légzését is leállítják, de a garat alsó részébe vagy a légcsővébe vezetett puha gumi vagy műanyag csövön keresztül lehetőség nyílik a biztonságos lélegeztetésre, miközben a szükséges oxigént és altatógázokat altatógépeink adagolják. Az életfontos szervek működését műszeresen és személyesen is folyamatosan ellenőrizzük és szükség esetén intravénás gyógyszerekkel avatkozunk be. Ezért vénába vezetett kanült mindig biztosítunk. Szükséges esetben ún. Centrális véna kanült kell behelyeznünk, melyet a nyakon, vagy a kulcscsont alatt helyi érzéstelenítésben szűrővel készítünk. Ez alkalmas arra, hogy gyógyszereket adagoljunk, vért vegyünk vizsgálatra, vagy az érpályában lévő nyomást mérjük. Ezek a beavatkozások és előkészületek azt a célt szolgálják, hogy az altatással járó esetleges szövődmények esélyét minimálisra csökkentsék. A tubus bevezetése során előfordulhat, hogy meglazult fogai sérülhetnek. Az altatás következményeként a műtét utáni napokban enyhe nyelési panasz és izomláz jelentkezhet.

A kérdésekre adott válaszokon és vizsgálati leleteken túl az érzéstelenítést befolyásoló eltérésről tudomásom nincs. Adatok kezelését korlátozó bejelentés nem hangzott el. Sejt, szövet, szerv átadással kapcsolatos fenn-tartás közlésére nem került sor. Az érzéstelenítéssel kapcsolatos felvilágosító tájékoztatót írásban megkaptam, lehetőségem volt elolvasni, az abban foglaltakat mérlegelni és azt az érzéstelenítő orvossal meg-beszélni. Állapotom ismeretében az érzéstelenítő orvos szobában is igényeimnek megfelelően tájékoztatót, kérdéseimre kielégítő válaszokat kaptam, további kérdéseim nincsenek. A tervezett műtétemhez elkerülhetem az érzéstelenítésbe, altatásba, valamint az ahhoz szükség esetén kapcsolódó intenzív kezelésbe, szabadon döntve beleegyezem.

.....  
vizsgáló, orvos aláírása

.....  
beteg (v. törv. képviselője) aláírása