

## Tisztelt Betegünk!

Önnek kezelőorvosa 24 órás vérnyomás monitorozást rendelt el.  
Reggel 7 órakor helyezzük fel a készüléket, amit másnap reggel 7 órára kell visszahozni. Az időpont betartása fontos, mert a gép használata folyamatos.  
A készülék értéke: 800.000.- Ft, ezért kérjük vigyázzon annak épségére, amíg Önnél van, felelősséggel tartozik érte, amit aláírásával tudomásul vesz.

Szentes, .....

Beteg aláírása: .....

Dr. Oroszi Miklós  
Kardiológus

## TERHELÉSES EKG-VIZSGÁLAT

Önt, Tisztelt Betegünk, mellkasi panaszai miatt vizsgáljuk. Célunk annak eldöntése, hogy mellkasi panasza mögött koszorúér-betegség igazolható-e. Fizikai terhelés mellett - állandó EKG-ellenőrzés alatt - próbáljuk a terheléssel a koszorúér-betegségre jellemző EKG-eltérést megjeleníteni. A fizikai terhelés futószőnyegen történik, amikor is könnyű sétából elindulva fokozatosan emeljük a terhelést. Ez azt jelenti, hogy részben emelkedőn, részben nagyobb sebességgel kell gyalogolnia. Közben időnkénti vérnyomás ellenőrzés történik. A vizsgálat akkor értékelhető, ha sikerült elérni életkorának megfelelően egy viszonylag magas percenkénti pulzusszámot.

Tudnia kell, hogy a vizsgálatnak lehetnek következményei:

- mellkasi fájdalom
- ritmuszavar
- vérnyomás-emelkedés vagy csökkenés
- súlyos koszorúér-betegség esetén -kb. 5000:1-2 esetben heveny szívizomelhalás, és/vagy hirtelen szívhalál -

Javasoljuk, hogy a vizsgálatot követően 15-30 percet maradjon még az osztályon, közérzetétől függően.

Kérem, figyelmesen olvassa át a fentieket. Amennyiben az orvosi felvilágosítás után is vállalja a vizsgálatot, aláírásával jelezze beleegyezését.

Szentes, 201..... hó ..... nap

.....  
aláírás

Datum:

## GYÓGYSZERES TERHELÉSES EKG-VIZSGÁLAT

Önt, Tisztelt Betegünk mellkasi panaszai miatt vizsgáljuk. Célunk annak eldöntése, hogy mellkasi panasza mögött koszorúér-betegség igazolható-e? Mivel fizikai terhelést valamilyen ok miatt nem tudunk végezni, gyógyszeres terhelésre kerül sor, közben folyamatos EKG-ellenőrzés történik. A terhelés során 4 percen keresztül folyamatosan adunk értágító injectiot, majd 3 perc múlva adjuk be az izotóp anyagot, ami a szívizomzathoz kötődik. További vizsgálat az Izotóp Laborban folytatódik. A gyógyszer értágító hatású, emiatt átmenetileg fejfájása, melegségérzet, zsibbadás jelentkezhethet.

Tudnia kell, hogy a vizsgálatnak lehetnek következményei:

- Mellkasi fájdalom
- Ritmuszavar,
- Vérnyomás emelkedés, vagy esés,
- Súlyos koszorúér-betegség esetén kb. 5000:1-2 esetben heveny szívizomelhalás és/vagy hirtelen szívhalál.

Javasoljuk, hogy a vizsgálatot követően 15-30 percet maradjon még az osztályon közérzetétől függően.

Kérem, figyelmesen olvassa át a fentieket. Amennyiben az orvosi felvilágosítás után is vállalja a vizsgálatot, aláírásával jelezze beleegyezését.

Szentes, 20 ..... hó..... nap

Név  
Szül  
Cím  
TAX  
Tel

.....  
aláírás

TS

1. 2g